



بخش CCU2

سکته قلبی



بیمارگرایی:

از اعتماد و حسن نظر جنابعالی نسبت به انتخاب این

مجتمع کمال تشکر را داریم.

بمفاتی که در دست دارید حاوی اطلاعات ضروری در

خصوص بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و

مراقبت آن می باشد.

تهیه و تنظیم: اکرم روصی

کمیته آموزش به بیمار

رامستان ۹۱

منابع: کتاب برونر سودارت (بخش قلب)

" قفل موفقیت را با کلید آموزش باز کنیم. "

با آرزوی بهبودی و سلامتی روزافزون

آدرس: کاشان - بلوار قلب راوندی - جنب دانشگاه علوم پزشکی

Email: beheshtihospital@kaums.ac.ir

تلفن تماس: ۰۲۶۱-۵۵۵۰۰۲۶-۳۹

داخلی: ۵۶۲-۳۳۵

دورنما: ۰۲۶۱/۵۵۵

▪ مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین را محدود کنید .

▪ به نوعی تفریح مناسب بپردازید که فشار عصبی را کاهش

دهد .

▪ هر روز راه بروید. مدت و فاصله راه رفتن را طبق دستور

پزشک افزایش دهید.

▪ از ورزش بلافاصله بعد از مصرف غذا خودداری کنید.

▪ در صورت فشار یا درد قفسه سینه که در مدت ۱۵ دقیقه بعد

از مصرف نیتروگلسیرین برطرف نمی شود به نزدیکترین مرکز

فوریتها اطلاع دهد.

▪ قرص زیر زبانی را همیشه همراه خود داشته باشید و در

مواقع درد قفسه سینه و یا قبل از انجام فعالیت هایی که باعث

ایجاد درد می شود از آن استفاده کنید .

علائم زیر را به پزشک اطلاع دهد.

▪ تنگی نفس

▪ غش و سنکوب

▪ ضربان قلب کند یا تند

▪ تورم پاها و مچ پاها

سکته قلبی وضعیتی است که در آن قسمتهایی از عضله قلب از بین می‌روند. این حالت در نتیجه تنگی یا انسداد رگهای قلب بوجود می‌آید.

سکته قلبی با چه علائمی همراه است؟

- درد ناگهانی و معمولاً در قسمت پائین استخوان جناغ و بالای شکم.
- درد سکته قلبی سنگین و فشاردهنده است و امکان دارد به شانه‌ها، بازوی چپ و در مواردی به فک و گردن انتشار پیدا کند. درد سکته قلبی خود بخود شروع و چند ساعت تا چند روز ادامه و با استراحت یا نیتروگلسیرین برطرف نمی‌شود.
- نبض سریع، نامنظم، ضعیف یا حتی غیر قابل لمس
- تنگی نفس
- رنگ پریدگی
- عرق سرد
- سرگیجه یا احساس سبکی سر
- تهوع و استفراغ

بیمار مبتلا به دیابت در صورتی که دچار سکته قلبی شود ممکن است چندان از درد شکایت نکند.

سکته قلبی چگونه درمان می‌شود؟

اقدامات درمانی:

- ۱- اقدامات دارویی
- ۲- درمان با اکسیژن
- ۳- مسکن‌ها

بیماران مبتلا به سکته قلبی چه مواردی را باید رعایت کنند؟

- از انجام فعالیتهایی که باعث درد قفسه‌سینه، تنگی‌نفس یا خستگی بی‌مورد می‌شود خودداری کنید.
- بین کار و فعالیت به استراحت بپردازید. کمی خستگی طبیعی است، و در دوران نقاهت انتظار می‌رود.
- در برنامه‌ریزی فعالیت‌های روزانه کارهای سبک و سنگین را بطور متناوب انجام دهید.
- ۲-۳ هفته از رانندگی اجتناب کند.

- قبل از انجام مقاربت برای جلوگیری از حملات در حین و پس از مقاربت می‌توانید از قرص زیر زبانی استفاده نمایید.
- از انجام فعالیت جنسی در زمان خستگی و پس از خوردن غذای سنگین خودداری کنید.
- روزی ۳ تا ۴ بار غذا بخورید.
- از خوردن غذای زیاد و عجله در غذا خوردن خودداری کنید.
- از نرم‌کننده‌های مدفوع برای جلوگیری از زور زدن در هنگام اجابت مزاج استفاده کنید.
- از روغن ماهی، زیتون، ذرت و کنجد که ارزش غذایی زیادی دارند استفاده نمایید.
- بجای سرخ کردن غذا از کباب یا بریان یا آب‌پز کردن استفاده کنید.
- برای طعم دادن به غذا بجای نمک از ابلیمو، سرکه، میوه و سبزیجات معطر استفاده نمایید.
- استفاده از غذاهایی مانند سوپا، کلم، لوبیا سبز و قرمز، نان گندم، برنج سیوس‌دار، جو، سیب، گلابی، می‌تواند در کاهش کلسترول مؤثر باشد.